

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 22-7-69 957794

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

11, Rue de la Vigilance — 69 - LYON-3^e
Tél. 60-66-24 et 60-69-55

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F

C.C.P. LYON 9431-17
Régisseur Avances et Recettes D.D.A.
51, Av. Maréchal-Foch - LYON-6^e

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

2^{ème} supplément au bulletin N° 106 de juillet 1969

17 juillet 1969

page 24

AVERTISSEMENTS & INFORMATIONS

V I G N E

BOTRYTIS - Tenir compte des indications fournies par le précédent bulletin en ce qui concerne les mesures destinées à diminuer les risques de développement de cette maladie.

MILDIOU & BLACK-ROT - Maintenir une couverture fongicide, cuprique de préférence eu égard au Botrytis, seulement dans les vignes où ces maladies sont visibles.

VERS DE LA GRAPPE - Par suite de l'étalement du vol de 2^{ème} génération et des pluies qui sont intervenues depuis le dernier traitement, faire une application, de préférence par poudrage, dans toutes les situations.

OIDIUM - Maintenir la protection sur cépages sensibles.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE - Appliquer dès réception un traitement en toutes régions.

TORDEUSE ORIENTALE SUR PECHERS - Maintenir la protection en fonction des dates présumées de récolte.

ACARIENS - si nécessaire
Intervenir dans les plantations, précédemment attaquées.

OIDIUM DU PECHER & OIDIUM DU POMMIER - Renouveler les traitements dans les vergers attaqués.

CULTURES DIVERSES

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE ET DE LA TOMATE - ALTERNARIA SUR TOMATE - Poursuivre la protection selon les indications du bulletin N° 106.

OIDIUM DU CASSISSIER - Poursuivre protection après récolte.

OIDIUM DES CULTURES LEGUMIERES - Les fongicides suivants peuvent être utilisés:

- Binapacryl: 50gr m.a/hl jusqu'à 21 jours avant récolte
- Oxythioquinox: 7gr5 m.a/hl - Dinocap: 25gr m.a/hl
- Draxozolon: 50gr m.a/hl - Benomyl: 15gr m.a/hl
- Thiabendazole: 1000gr m.a/hl.

Ces 3 derniers sont préconisés sur cucurbitacées.

Le soufre micronisé doit être utilisé en tenant compte des questions variétales et de la température. Contre l'Oïdium du cardon (Leveillula) on ajoutera au Dinocap un mouillant.

Pour l'Inspecteur de la Protection
des Végétaux
H. MILAIRE

L'Agent technique de la
Protection des Végétaux
G. FERAND

Pour le Contrôleur chargé
des Avertissements Agric.
G. DE CRUZ

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes
Directeur-gérant: L. BOUYX

P68